

PATIENTINFORMATION



SJUKA BARN I DAGVÅRDEN

Små barn drabbas ofta av infektionssjukdomar. Sjuka barn ska inte föras till dagvård. Barnet behöver tillräcklig tid för återhämtning efter att ha varit sjukt. Barn behöver vila för att bli friska, och smittsamma sjukdomar kan också vara farliga för andra.

När febern har gått ner betyder det inte automatiskt, att barnet skulle orka delta i det normala dagsprogrammet på dagis under en hel dag.



Vårdnadshavaren ska anmäla till daghemmet när barnet är sjukt. Om barnet insjuknar under dagen meddelar daghemmet vårdnadshavaren.

Riktlinjer gällande vissa sjukdomar

De angivna frånvarotiderna är riktgivande minimitider. Det avgörande är hur barnet mår. Läkare kan också, beroende på omständigheterna, rekommendera frånvarotider som avviker från tabellen.

Sjukdomstid = den tid som barnet på grund av sin sjukdom inte kan delta i daghemmets normala verksamhet

SJUKDOM	SMITTVÄG	INKUBATIONSTID	SYM TOM	REKOMMENDERAD FRÅNVARO
Hosta, förkylning, bronkit	Sekret från näsa och svalg	1 - 3 d	Trötthet, snuva, hosta, halsont, feber	Sjukdomstiden
Öroninflammation	Sekret från näsa, svalg och öron		Öronvärk, förkylning, hosta, rinnande öra	Sjukdomstiden
Diarré, uppkastningar	Sekret från näsa, svalg och avföring	1 - 3 d	Trötthet, nedsatt aptit, uppkastningar, magbesvär, diarré. Ofta även feber.	Sjukdomstiden samt minst 1 dygn efter symtomfrihet. Salmonella, shigella och EHEC - frånvaro enligt läkares rekommendation.
Ögoninflammation, virusorsakad	Sekret från ögon, näsa och svalg	1 - 3 d	Röda, rinnande ögon i samband med förkylning	Sjukdomstiden
Ögoninflammation, bakteriell (mindre vanlig)	Sekret från ögon, näsa och svalg	1 - 3 d	Röda, rinnande och variga ögon	24 h efter påbörjad behandling
Impetigo (svinkoppor)	Sårsekret	1 - 3 d	Hudutslag, som sprider sig lätt och snabbt blir variga och skorviga	Tills utslagen börjat torka. (24 h efter påbörjad beh. med tablett, 48 h efter lokal antibiotika-behandling)



SJKDOM	SMITTVÄG	INKUBATIONSTID	SYMPTOM	REKOMMENDERAD FRÅNVARO
Streptokocktonsillit och scharlakansfeber	Sekret från näsa och svalg	1 - 5 d	Halsont, svullna lymfkörtlar, feber, illamående, hudutslag	Sjukdomstiden. Minst 24 h efter påbörjad behandling
Vattkoppor	Sekret från näsa och svalg och koppor	10 - 20 d	Feber, utslag som bildar blåsor och sedan torkar	Tills kopporna torkat; vanligen 5 - 6 dygn sedan utslagen börjat.
Parvovirusinfektion ("femte sjukan")	Sekret från näsa och svalg	6 - 16 d	Feber, rodnad på kinderna, utslag på kroppen, ledbesvär. Hos gravida kan infektion leda till missfall.	Sjukdomstiden. Smittar inte mer när utslagen uppstått.
Höstblåsor (enterovirus, "handfot-, och munsjuka")	Sekret från näsa och svalg, avföring	2 - 7 d	Feber, ibland utslag. Blåsor på handflator och fotsulor	Sjukdomstiden.
Springmask	Maskägg i avföringen	2 - 3 v	Klåda vid ändtarmen, särskilt på kvällen	Under behandlingen
Huvudlöss	Kontakt med levande löss	1 - 2 d	Klåda, gnetter, ibland symptomfri. Vanlig fyndplats bakom öronen och i nackgropen	Under behandlingen
Skabb	Kontaktsmitta	ca 1 mån	Kliande utslag, hudinfektioner, skabbgångar t.ex. mellan fingrarna	Under behandlingen
Mollusker	Kontaktsmitta		2-6 mm vårtor, med degaktigt innehåll. Infekteras lätt.	Frånvaro behövs inte.
Kikhosta	Sekret från näsa och svalg	1 - 3 v	Hosta, hostattacker, kikningar, kräkningar	Enligt läkares rekommendation
Hepatit	Blodsmitta	1 - 6 mån	Magbesvär, feber, nedsatt aptit, gulhet. Många symptomfria.	Enligt läkares rekommendation
Hiv	Blodsmitta			Enligt läkares rekommendation
MRSA-bärare	Kontaktsmitta		Symtomfri	Frånvaro behövs inte

Källor: Riktlinjer från Läkarsällskapet Duodecim samt Åbo stad; Social- och hälsovårdsväsendet.