



Användning av skyddsutrustning i olika situationer inom social- och hälsovård

Detta är ÅHS anvisning till den sociala sektorn om skyddsutrustning. Utgångspunkten är att principerna för användning av skyddsutrustning ska vara i samklang i social-, hälso- och sjukvård. Rutinerna varierar beroende på vårdssituation, vilket beskrivs i detta dokument.

3.4.2020

1. Vid varje klientmöte ska man följa basala hygienrutiner (desinfektion av händerna före och efter beröring).
2. De som arbetar i nära kontakt med klienter (mindre än 2 m) ska använda visir eller kirurgiskt munskydd för att skydda klienten mot eventuell smitta.
3. Det finns ingen medicinsk grund för att använda scarf eller mun- och nässkydd av tyg vid vård av symtomfria klienter.
4. Kirurgiskt munskydd används av både klienten och personal om klienten har luftvägssymtom. Om personal har symtom ska hen stanna hemma från jobbet tills två symtomfria dagar har passerat.
5. I den här anvisningen betyder "karantän" karantän enligt smittskyddslagen. Det är inte fråga om "karantänliknande förhållande" (t.ex. personer som återvänder hem efter resa).
6. Skyddsmaterial nivå 1 kan beställas från ÅHS för högst två veckors bruk. Nivå 2 ges ut endast vid behov. För stora beställningar beaktas inte, då man vill se till att materialet räcker till alla behövande. Alla beställningar skickas till skyddsutrustning-utdelning@ahs.ax

Tora Woivalin, smittskyddsansvarig läkare i primärvården

Marika Nordberg, infektionsläkare

Gunilla Häggblom, hygienskötare

Senaste uppdateringar		
Marika Nordberg och Gunilla Häggblom	Sid 1, punkt 1-6 + "Ingen skyddsutrustning" ändrad till "Visir"	2.7.2020
Gunilla Häggblom	Institutioner och ESB: Symtomfri, testad, väntar på svar...	9.11.2020
Gunilla Häggblom	Beställningsadressen ändrad: skyddsutrustning-utdelning@ahs.ax	10.11.2020



Verksamhet	Skyddsnivå	Kommentar
Hemtjänst, hemsjukvård, hembesök i boendeservice		
Klient utan luftvägssymtom	Visir	
Luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Klient i karantän, inga symtom	Visir	
Karantän, symtomfri, patientnära arbete	Nivå 1	
Karantän, luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Luftvägssymtom, testad, väntar på svar	Nivå 2	
Luftvägssymtom, testad positiv	Nivå 2	
Testad positiv, symtomfri, < 2 d sedan symtomen upphörde	Nivå 1	
Hälsocentral, mottagningsarbete (inte infektionsmottagning)		
Klient utan luftvägssymtom	Visir	
Klient utan luftvägssymtom, patientnära arbete	BHR enligt arbetsuppgifter	
Luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Klient i karantän, inga symtom	Visir	2 m avstånd
Karantän, symtomfri, patientnära arbete	Nivå 1	
Karantän, luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Luftvägssymtom, testad, väntar på svar	Nivå 2	
Luftvägssymtom, testad positiv	Nivå 2	
Testad positiv, symtomfri, < 2 d sedan symtomen upphörde	Nivå 1	
Institutioner och ESB		
Klient utan luftvägssymtom	Visir	
Klient utan luftvägssymtom, patientnära arbete	BHR enligt arbetsuppgifter	
Symtomfri, testad, väntar på svar	Nivå 1	Mask på vårdtagaren
Luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov



Klient i karantän, inga symtom	Visir	2 m avstånd
Karantän, symtomfri, patientnära arbete	Nivå 1	
Karantän, luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Luftvägssymtom, testad, väntar på svar	Nivå 2	
Luftvägssymtom, testad positiv	Nivå 2	
Testad positiv, symtomfri, < 2 d sedan symtomen upphörde	Nivå 1	
Missbrukarvård och barnhem		
Klient utan luftvägssymtom	Visir	
Luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov Förkläde endast om det behövs
Klient i karantän, inga symtom	Visir	
Karantän, symtomfri, patientnära arbete	Nivå 1	
Karantän, luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Luftvägssymtom, testad, väntar på svar	Nivå 2	
Luftvägssymtom, testad positiv	Nivå 2	
Testad positiv, symtomfri, < 2 d sedan symtomen upphörde	Nivå 1	
Personlig assistent, handikappservice		
Klient utan luftvägssymtom	Visir	
Klient utan luftvägssymtom, patientnära arbete	BHR enligt arbetsuppgifter	
Luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Klient i karantän, inga symtom	Visir	2 m avstånd
Karantän, symtomfri, patientnära arbete	Nivå 1	
Karantän, luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Luftvägssymtom, testad, väntar på svar	Nivå 2	
Luftvägssymtom, testad positiv	Nivå 2	



Personlig assistent, handikappservice forts.		
Testad positiv, symtomfri, < 2 d sedan symtomen upphörde	Nivå 1	
Taxichaufför eller annan tillfällig klientkontakt utanför social- och hälsovården		
Klient utan luftvägssymtom	Rekommenderas munskydd eller visir	
Klient i karantän, inga symtom	Rekommenderas munskydd eller visir	
Klient utan luftvägssymtom, patientnära arbete	BHR enligt arbetsuppgifter	
Luftvägssymtom	<ul style="list-style-type: none">• Ge ett kirurgiskt munskydd till patienten och be patienten desinficera händerna innan hen går in i taxin.• Patienten ska sitta i baksätet.• Vid behov kan munskydd ges även åt chauffören.• Efter transporten ska chauffören rengöra alla ytor som patienten vidrört (säkerhetsbälte, säte, dörrhandtag, baksidan av framsätet) med vanligt rengöringsmedel och hushållspapper.	
Karantän, symtomfri, patientnära arbete		
Karantän, luftvägssymtom		
Luftvägssymtom, testad, väntar på svar		
Luftvägssymtom, testad positiv		
Testad positiv, symtomfri, < 2 d sedan symtomen upphörde		