



## Användning av skyddsutrustning i olika situationer i social- och hälsovård

02.07.2020

Detta är ÅHS anvisning till den sociala sektorn avseende skyddsutrustning. Utgångspunkten är principerna för användning av skyddsutrustning ska vara i samklang både i socialvård, hälsovård och sjukvård. Rutinerna varierar beroende på vårdsituation, vilket beskrivs i detta dokument.

1. Vid varje klientmöte skall man följa basala hygienrutiner (desinfektion av händerna före och efter beröring).
2. De som arbetar i nära kontakt med klienter (mindre än 2 m) ska använda visir eller kirurgiskt munskydd för att skydda klienten mot eventuell smitta
3. Det finns inte medicinsk grund att använda scarf eller mun- och nässkydd av tyg vid vård av symtomfria klienter.
4. Kirurgiskt munskydd används av både klienten och personal om klienten har luftvägssymtom. Om personal har symtom ska hen stanna hemma från jobbet tills två symtomfria dagar passerat.
5. I den här anvisningen betyder "karantän" karantän enligt smittskyddslagen. Det är inte fråga om "karantänliknande förhållande" (t.ex. personer som återvänder hem efter resa).
6. Skyddsmaterial nivå 1 kan beställas från ÅHS för högst två veckors bruk. Nivå 2 ges ut endast vid behov. För stora beställningar beaktas inte, då man vill se till att materialet räcker till alla behövande. Alla beställningar går via Eeva Jansson, [eeva.jansson@ahs.ax](mailto:eeva.jansson@ahs.ax)

Tora Woivalin, smittskyddsansvarig läkare i primärvården

Marika Nordberg, infektionsläkare

Gunilla Häggblom, hygienskötare

*Uppdaterat av Marika Nordberg och Gunilla Häggblom*

*02.07.2020*



Verksamhet	Skydds nivå	Kommentar
<b>Hemtjänst, hemsjukvård, hembesök i boendeservice</b>		
Klient utan luftvägssymtom	Visir	
Luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Klient i karantän, inga symtom	Visir	
Karantän, symtomfri, patientnära arbete	Nivå 1	
Karantän, luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Luftvägssymtom, testad, väntar på svar	Nivå 2	
Luftvägssymtom, testad positiv	Nivå 2	
Testad positiv, symtomfri, <2d sedan symtomen upphörde	Nivå 1	
<b>Hälsocentral, mottagningsarbete (inte infektionsmottagning)</b>		
Klient utan luftvägssymtom	Visir	
Klient utan luftvägssymtom, patientnära arbete	BHR enligt arbetsuppgifter	
Luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Klient i karantän, inga symtom	Visir	2 m avstånd
Karantän, symtomfri, patientnära arbete	Nivå 1	
Karantän, luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Luftvägssymtom, testad, väntar på svar	Nivå 2	
Luftvägssymtom, testad positiv	Nivå 2	
Testad positiv, symtomfri, <2d sedan symtomen upphörde	Nivå 1	
<b>Institutioner och ESB</b>		
Klient utan luftvägssymtom	Visir	
Klient utan luftvägssymtom, patientnära arbete	BHR enligt arbetsuppgifter	
Luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Klient i karantän, inga symtom	Visir	2 m avstånd



Karantän, symtomfri, patientnära arbete	Nivå 1	
Karantän, luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Luftvägssymtom, testad, väntar på svar	Nivå 2	
Luftvägssymtom, testad positiv	Nivå 2	
Testad positiv, symtomfri, <2d sedan symtomen upphörde	Nivå 1	
<b>Missbrukarvård och barnhem</b>		
Klient utan luftvägssymtom	Visir	
Luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov Förkläde endast om det behövs
Klient i karantän, inga symtom	Visir	
Karantän, symtomfri, patientnära arbete	Nivå 1	
Karantän, luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Luftvägssymtom, testad, väntar på svar	Nivå 2	
Luftvägssymtom, testad positiv	Nivå 2	
Testad positiv, symtomfri, <2d sedan symtomen upphörde	Nivå 1	
<b>Personlig assistent, handikappservice</b>		
Klient utan luftvägssymtom	Visir	
Klient utan luftvägssymtom, patientnära arbete	BHR enligt arbetsuppgifter	
Luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Klient i karantän, inga symtom	Visir	2 m avstånd
Karantän, symtomfri, patientnära arbete	Nivå 1	
Karantän, luftvägssymtom	Nivå 1	Visir/skyddsglasögon vid behov
Luftvägssymtom, testad, väntar på svar	Nivå 2	
Luftvägssymtom, testad positiv	Nivå 2	



<b>Personlig assistent, handikappservice forts.</b>		
Testad positiv, symtomfri, <2d sedan symtomen upphörde	Nivå 1	
<b>Taxichaufför eller annan tillfällig klientkontakt utanför social- och hälsovården</b>		
Klient utan luftvägssymtom	Rekommenderas munskydd eller visir	
Klient i karantän, inga symtom	Rekommenderas munskydd eller visir	
Klient utan luftvägssymtom, patientnära arbete	BHR enligt arbetsuppgifter	
Luftvägssymtom	Ge ett kirurgiskt munskydd till patienten och be patienten desinficera händerna innan den går in i taxin. Patienten ska sitta i baksätet. Vid behov kan munskydd ges även åt chauffören. Efter transporten ska chauffören rengöra alla ytor som patienten vidrört (säkerhetsbälte, säte, dörrhandtag, baksidan av framsätet) med vanligt rengöringsmedel och hushållspapper	
Karantän, symtomfri, patientnära arbete		
Karantän, luftvägssymtom		
Luftvägssymtom, testad, väntar på svar		
Luftvägssymtom, testad positiv		
Testad positiv, symtomfri, <2d sedan symtomen upphörde		