



Recidiverande erosioner

– återkommande hornhinnesor

Hornhinnan är mycket rikligt försedd med smärtekänsliga nervtrådar. Det gör därför ont och skaver ordentligt om en skada uppkommer på hornhinnans yta. Det är också vanligt med tårflöde, ljuskänslighet och svårigheter att öppna ögat.

Ofta läker en yttlig skada på hornhinnan på några timmar till dagar, men viss svaghet i det skadade området kan kvarstå under lång tid. Såret kan därför gå upp igen även vid till synes små påfrestningar, till exempel på morgonen när ögat är torrare än vanligt. Man får då samma symptom som vid det ursprungliga såret.

Behandling

Smörjande och bakteriedödande salva i akutskedet. Därefter smörjande behandling åtminstone till natten under en längre tid, ofta någon månad. Om fortsatta besvär trots detta kan man överväga att skydda hornhinnan under läkningsperioden med en tunn kontaktlins. Om inte heller detta är nog för sårhäkning kan annan behandling bli aktuell, till exempel så kallad Excimerlaser. I akutskedet kan receptfria smärtlindrande tabletter vara av värde.

Bedövande ögondroppar används ofta för att underlätta ögonundersökningen. Dropparna tar bort en stor del av besvären men påverkar läkningen negativt och får därför inte användas som behandling.

Bengt Svedmyr, ögonspecialist/201306