



Vagel och chalazion

Vagel

I ögonlocket finns en mängd små körtlar och när någon av dessa infekteras uppstår en **vagel** som är ofarlig. Normalt svullnar ögonlocket upp och ömmar under 1–2 dygn, för att därefter spontant klinga av under ca 10 dagar. Inte sällan brister vageln, varvid lite var och blod tömmer sig och knutan skrumpnar ihop.

I de allra flesta fall behöver man inte sätta in någon form av behandling. Skulle vageln tillväxa och uppvisa en betydande storlek kan man överväga att på hälsocentralen sticka i och dränera vageln och i undantagsfall sätta in antibiotika.

Vaglar kan förekomma i ökad utsträckning vid hudsjukdomar exempelvis acne rosacea, atopi. När dessa sjukdomar föreligger kan det ibland hjälpa att äta antibiotikum. För utredning kring detta skall du prata med hälsocentralen.

Chalazion eller kronisk vagel

Ett **chalazion** uppstår när utförsången till en ögonlockskörtel täpps till. Körteln sväller då upp och ses som en oöm ibland lätt rodnad knöl.

Majoriteten av alla chalazier försvinner utan åtgärd inom 6 månader. Ett chalazion som finns kvar efter 6 månader kan opereras i lokalbedövning om patienten så önskar, men är ofarligt och kan lämnas utan åtgärd om man är helt obesvärad.

Det är vanligt att vaglar och chalazier återkommer.

Bengt Svedmyr, ögonspecialist/2020